

重症化リスク

- ・ 60歳以上
- ・ 肥満 (BMI \geq 30)
- ・ 糖尿病
- ・ 高血圧
- ・ 心血管性疾患
- ・ 慢性呼吸器疾患
- ・ ヘビースモーカー
- ・ 慢性腎臓病
- ・ 活動性のがん
- ・ 免疫抑制状態
- ・ 免疫抑制薬内服中
- ・ 医学的複雑性を付与する疾患

COVID19患者

・ 高熱・強い咳症状・強い咽頭痛などの臨床症状がある

・ 12歳以上

・ **妊婦又は妊娠する可能性のある女性・授乳婦でない**

・ COVID発症3日以内

・ eGFRが30m/min未満・中等度肝機能障害の場合は有益性が上回る場合に投与を考慮

・ 内服薬を**全て**確認でき、相互作用がない/回避できる

経過観察

ゾコーバ5日間治療

- ・ 文書セレクトより同意書発行
- ・ 同意書原本は診療科保管、コピー1部を患者へ、コピー1部を薬剤部へ持参
- ・ オーダーは電子カルテのセット処方から行う
- ・ 1日目は375mg(3錠)、2～5日目は125mg(1錠)を1日1回内服
- ・ **患者交付時は服用方法を指導**

はい

いいえ

重症化リスクを有さない軽症患者

酸素投与を有する中等症以上

重症化リスクを有する酸素投与が必要ない軽症患者

・ 12歳以上かつ40kg以上

・ COVID発症5日以内

・ eGFR \geq 30ml/min

・ 内服薬を**全て**確認でき、相互作用がない/回避できる

はい

・ COVID発症7日以内

・ 入院して点滴治療が可能

はい

・ 18歳以上

・ COVID発症5日以内

・ 非妊婦もしくは非授乳婦

・ カプセルが内服可能

はい

パキロビッド5日間治療

- ・ 文書セレクトより同意書発行
- ・ 同意書原本は診療科保管、コピー1部を患者へ、コピー1部を薬剤部へ持参
- ・ eGFRが30～60m/minの場合、**減量投与**
- ・ オーダーは電子カルテのセット処方から行う
- ・ 1日2回、1回に2種類の薬剤を同時に内服する
- ・ 1シートに1日分 (ニルマトレルビルとリトナビル) が含まれる
- ・ **患者交付時は服用方法を指導**

ラゲプリオ5日間治療

- ・ 文書セレクトより同意書発行
- ・ 同意書原本は診療科保管、コピー1部を患者へ、コピー1部を薬剤部へ持参
- ・ オーダーは電子カルテのセット処方から行う
- ・ 1回4カプセル、1日2回、5日間
- ・ ボトル製剤、1ボトルあたり40カプセル
- ・ **患者交付時は服用方法を指導**

ベクルリー3日間治療

- ・ オーダーは電子カルテのセット処方から行う
- ・ 初回200mg、2-3日目100mg
- ・ 小児の場合は初回5mg/kg、2-3日目2.5mg

- ・ **ベクルリー 5日間/10日間投与**
- ・ **デキサメタゾン ± 免疫抑制薬**
- ・ **抗凝固療法**

経過観察

2022.8.29 ver 1.1
 薬剤部への同意書：原本→コピーに変更
 2022.11.30 ver1.2
 ゾコーバ追加